

# Фтизоэтам®

## ДВА ПРЕПАРАТА — ДВА РЕШЕНИЯ: ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.

- В 2 раза уменьшают количество потребляемых таблеток в сутки<sup>1,2,3</sup>
- Применяются для профилактики и лечения туберкулеза легких<sup>2,3,4,5,6</sup>
- Разрешены к применению у детей<sup>2,3</sup>
- Полный цикл российского производства<sup>2,3</sup>



## Фтизоэтам®

Препарат первого выбора для лечения туберкулеза легких, включенный в ЖНВЛП<sup>2,4,5,7</sup>

## Фтизоэтам® B<sub>6</sub>


Препарат выбора для профилактики и лечения туберкулеза легких<sup>3,6,7</sup>

**Информация для специалистов здравоохранения.**  
Перед назначением препарата ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Список литературы:

1. Инструкции по применению лекарственных препаратов, соответствующих МНН, утвержденные МЗ РФ.
2. Инструкция по применению на лекарственный препарат Фтизоэтам®, утвержденная МЗ РФ.
3. Инструкция по применению на лекарственный препарат Фтизоэтам® B<sub>6</sub>, утвержденная МЗ РФ.
4. Перечень ЖНВЛП на 2020г утвержденный распоряжением Правительства №2406-р от 12 октября 2019 «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год.»
5. Приказ №951 от 29.12.2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».
6. Инструкция по химиопрофилактике туберкулеза у взрослых больных ВИЧ-инфекцией, под редакцией И.А. Васильевой, Е.Е. Воронина, В.В. Покровского, 14.03.2016 г.
7. Перечень ЖНВЛП на 2019г утвержден распоряжением Правительства РФ N 2738-р от 10 декабря 2018 г. «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год»

АО «Акрихин» 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, улица Кирова, дом 29, тел: +7 (495) 702.95.06.



**Торговое наименование:**  
ФТИЗОЭТАМ®.

**Регистрационный номер:**  
ЛС-000102  
от 17.12.2014.

**МНН:**  
Изониазид + этамбутол.

## СОСТАВ:

1 таблетка содержит активные вещества: изониазид – 150 мг, этамбутола гидрохлорид – 400 мг.

## ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Противотуберкулезное комбинированное средство. Код АТХ: J04AM03.

## ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Лечение всех форм туберкулеза, вызванных чувствительной к изониазиду и этамбутолу *M.tuberculosis*, в составе комбинированной терапии.

Профилактика туберкулеза у взрослых ВИЧ-инфицированных пациентов.

Необходимо принимать во внимание действующие официальные руководства по правилам применения антибактериальных препаратов.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказан детям до 13 лет, пациентам с гиперчувствительностью к изониазиду, этамбутолу или любому другому компоненту препарата; при эпилепсии и других заболеваниях, сопровождающихся склонностью к судорогам, неконтролируемой артериальной гипертензии, тяжелой коронарной недостаточности, циррозе печени, лекарственном гепатите и/или других тяжелых побочных реакциях, развившихся на фоне предшествующего лечения препаратом, содержащим в составе изониазид, заболеваниях печени в стадии обострения, печеночной недостаточности тяжелой степени тяжести; микседеме, при неврите зрительного нерва, катаракте, диабетической ретинопатии, бронхиальной астме, псориазе, гиперурикемии, острой подагре, язвенной болезни желудка, воспалительные заболевания глаз, беременности, в период грудного вскармливания.

## С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

Алкоголизм, печеночная недостаточность легкой и средней степени тяжести, нарушения функции печени в анамнезе или хронические нарушения функции печени, почечная недостаточность, возраст старше 35 лет, длительный прием других потенциально гепатотоксических лекарственных средств, отмена терапии изониазидом в анамнезе, периферическая нейропатия, ВИЧ-инфекция, декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, артериальная гипертензия), компенсированный гипотиреоз, сахарный диабет, истощение, психические заболевания в анамнезе, «медленные ацетиляторы», женский пол.

## ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Смотреть в инструкции к препарату.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Лечение у взрослых и детей старше 13 лет (при возможности проведения офтальмологического контроля). Применяется внутрь, после еды, 1 раз в сутки. Дозирование проводится по изониазиду: 5-10 мг/кг массы пациента. Максимальная суточная доза изониазида 600 мг. Общая курсовая доза препарата Фтизоэтам® для каждого пациента индивидуальна и зависит от характера заболевания, эффективности лечения и переносимости.

*Профилактика туберкулеза у взрослых ВИЧ-инфицированных пациентов:* Внутрь, дозирование проводится по изониазиду, по 5-10 мг/кг/сутки, максимальная суточная доза 600 мг. Дозы и длительность приема должны определяться согласно официальным действующим федеральным руководствам по туберкулезу.

## ФОРМА ВЫПУСКА:

Таблетки.

По 100 таблеток в банке из полипропилена (полиэтилена). 25 банок по 100 таблеток вместе с инструкциями по применению в коробке из картона.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## УСЛОВИЯ ОТПУСКА:

По рецепту.

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



## Торговое

**наименование:**  
ФТИЗОЭТАМ® В<sub>6</sub>.

## Регистрационный номер:

ЛС-002335  
от 27.07.2015.

## МНН:

Изониазид + этамбутол  
+ пиридоксин.

## С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

Алкоголизм, печеночная недостаточность легкой и средней степени тяжести, нарушения функции печени в анамнезе или хронические нарушения функции печени, почечная недостаточность, судорожные припадки, возраст старше 35 лет, длительный прием других потенциально гепатотоксических лекарственных средств, отмена терапии изониазидом в анамнезе, периферическая нейропатия, ВИЧ-инфекция, декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, артериальная гипертензия), гипотиреоз, сахарный диабет, истощение, психические заболевания в анамнезе, «медленные ацетиляторы», женский пол.

## ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Подробное описание смотреть в инструкции к препарату.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

**Лечение:** Внутрь, после еды, один раз в сутки. Дозирование проводится по изониазиду: 5-10 мг/кг массы больного. Общая курсовая доза Фтизоэтам® В<sub>6</sub> для каждого больного индивидуальна и зависит от характера заболевания, эффективности лечения и переносимости.

**Профилактика:** Внутрь, по 5-10 мг/кг/сутки, максимальная суточная доза 600 мг. Дозы и длительность приема должны определяться согласно официальным действующим федеральным руководствам по туберкулезу.

## ФОРМА ВЫПУСКА:

Таблетки.

По 100 таблеток в банке из полипропилена (полиэтилена) или флаконе для лекарственных средств из пластика. Каждая банка или флакон вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## УСЛОВИЯ ОТПУСКА:

По рецепту.

## СОСТАВ:

1 таблетка содержит активные вещества: изониазид – 150 мг, этамбутола гидрохлорид – 400 мг, пиридоксина гидрохлорид – 15 мг.

## ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Противотуберкулезное средство комбинированное.  
Код АТХ: J04AM03.

## ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Лечение и профилактика всех форм туберкулеза, вызванных чувствительной к изониазиду и этамбутолу *M.tuberculosis*, в составе комбинированной терапии. Необходимо принимать во внимание действующие официальные руководства по правилам применения антибактериальных препаратов.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказан детям до 12 лет, пациентам с гиперчувствительностью к изониазиду, этамбутолу или любому другому компоненту препарата; при эпилепсии и других заболеваниях, сопровождающихся склонностью к судорогам, неконтролируемой артериальной гипертензии, тяжелой коронарной недостаточности, циррозе печени, лекарственном гепатите и/или других тяжелых побочных реакциях, развившихся на фоне предшествующего лечения препаратом, содержащим в составе изониазид, заболеваниях печени в стадии обострения, печеночной недостаточности тяжелой степени тяжести; микседеме, при неврите зрительного нерва, катаракте, диабетической ретинопатии, бронхиальной астме, псориазе, гиперурикемии, острой подагре, язвенной болезни желудка, язвенной болезни 12-перстной кишки, беременности и лактации.